


**Resposta ao zika 2016: Algoritmo para testes de indivíduos sintomáticos nos EUA\***  
**Amostras coletadas ≥ 14 dias após o início dos sintomas.**



**OBSERVAÇÃO:** Reportar todos os resultados de testes às autoridades de saúde competentes. Os resultados devem ser considerados no contexto dos sintomas, da exposição ao risco e do momento da coleta da amostra.

\*Pacientes sintomáticas grávidas e não grávidas

\*\*Observe que a reatividade cruzada dos anticorpos com outros flavivírus complica a interpretação dos testes IgM antizika atuais. O teste de IgM da dengue deve ser realizado para mulheres grávidas sintomáticas, indivíduos com possível exposição à dengue e quando outro resultado de flavivírus suspeito for obtido. Veja o texto nas páginas 3 a 5 para obter informações adicionais.

\*\*\* Observe que se os testes de IgM para zika e dengue não forem reativos, testes de IgM antichikungunya também devem ser realizados para pessoas com risco de exposição ao vírus chikungunya e doença clinicamente compatível.

‡A confirmação por PRNT não é uma recomendação de rotina atualmente para Porto Rico. Consulte a página 5 para obter mais informações.

Idioma inglês, versão acessível: <http://www.cdc.gov/zika/pdfs/algorithm-for-us-testing-of-symptomatic-individuals-chart-2.pdf>